

Emergenza sanitaria Covid-19

PROCEDURA “GESTIONE CASO SOSPETTO COVID-19” STUDENTE

Rif. normativo: Rapporto dell'I.S.S. COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19?

DIRIGENTE SCOLASTICO INCARICA:

-L'ADDETTO CHIAMATA AL GENITORE/TUTORE LEGALE
-L'ADDETTO CHE ACCOMPAGNA E ACCUDISCE IL CASO SOSPETTO NEL “LOCALE DI ISOLAMENTO CASO SOSPETTO COVID-19”, PREFERIBILMENTE UN LAVORATORE CHE NON PRESENTI FATTORI DI RISCHIO

Il personale scolastico avvisa il referente scolastico Covid-19

Il referente scolastico Covid-19 fa avvertire immediatamente il genitore/tutore legale

Il personale scolastico chiama l'addetto che, indossando la mascherina chirurgica e mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, dota l'alunno (se sprovvisto, se maggiore di sei anni e se la tollera) di una mascherina chirurgica e lo accompagna nel “locale di isolamento caso sospetto Covid-19”

Il referente scolastico Covid-19 registra e tiene monitorato il “caso sospetto” e rimane a disposizione del referente Covid-19 del DdP predisponendo gli elenchi di studenti e docenti della classe presenti delle ultime 48 ore dalla comparsa dei sintomi

L'addetto accudisce il “caso sospetto Covid-19” fino all'arrivo del genitore/tutore legale

L'addetto, mantenendo la distanza di un metro, si assicura che il locale sia costantemente areato. Nel caso in cui lo studente non può indossare la mascherina, fa rispettare l'etichetta respiratoria.

L'addetto procedere alla rilevazione della temperatura corporea

L'addetto provvede alla pulizia e disinfezione delle superfici del locale come indicato nell'all.1 del documento del Ministero dell'Istruzione del 26/06/2020.

Arrivo del genitore/tutore legale e consegna del “caso sospetto” unitamente alle seguenti istruzioni: i genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso